



# COVID-19

## FICHE D'INFORMATION SUR LA VACCINATION

Le vaccin contre la COVID-19 devient disponible dans les communautés de l'ensemble du Canada. Veuillez consulter le site Web de votre organisme de santé publique local pour connaître les détails et les délais dans votre région.

Le groupe de travail sur la COVID-19 et les MII de Crohn et Colite Canada recommande que les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) soient vaccinées contre la COVID-19 dès qu'un vaccin est disponible. Malgré l'absence d'étude concernant l'innocuité ou l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez les personnes atteintes de MII, le groupe de travail estime qu'ils sont sans danger et devraient être offerts aux personnes atteintes de MII.

	Comme toujours, discutez des risques et des avantages avec votre fournisseur de soins de façon à prendre une décision éclairée en fonction de votre situation personnelle
	Il est recommandé de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner dès que possible
	Si vous faites partie des groupes prioritaires pour l'accès aux vaccins, vous ne devez pas être dépriorisé en raison d'un diagnostic de MII ou d'un traitement immunosuppresseur

## QUESTIONS COURANTES

### Quels sont les vaccins contre la COVID-19 ?

À l'heure actuelle, Santé Canada a approuvé quatre vaccins :

- Le vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech
- Le vaccin à ARNm de Moderna
- Le vaccin à vecteur adénoviral non répliquatif de l'Université d'Oxford/AstraZeneca
- Le vaccin à vecteur adénoviral non répliquatif de Johnson & Johnson

### Que sait-on de l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 chez les personnes atteintes de MII ?

- Les essais cliniques actuels sur les vaccins ne comptaient pas de personnes atteintes de maladies auto-immunes ou à médiation immunitaire ni de personnes recevant un traitement immunosuppresseur. Des données sur l'innocuité et l'efficacité au sein de cette population seront bientôt disponibles.

### Quel vaccin est recommandé ?

- Vous devriez recevoir le premier vaccin auquel vous avez accès. Votre médecin pourra vous expliquer les avantages de chaque vaccin, mais tous les vaccins offrent une protection élevée contre les cas graves de COVID-19.

### Quand devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19 ?

- Dès la première occasion qui se présentera à vous, selon les règles de chaque province.
- Aucune étude ne montre que la vaccination devrait être réalisée à un certain moment du cycle des perfusions ou injections de médicaments biologiques.
- Les personnes atteintes de MII qui prennent des stéroïdes devraient discuter avec leur médecin du moment où elles devraient se faire vacciner.

### Les vaccins peuvent-ils déclencher une poussée de MII ?

- Rien n'indique que les vaccins provoquent des poussées de MII. Bien qu'aucune étude n'ait été réalisée sur les vaccins contre la COVID-19 chez les personnes atteintes de MII, le risque est probablement faible.
- N'arrêtez pas vos médicaments contre les MII à moins que votre médecin ne vous le demande. L'interruption d'un traitement immunosuppresseur (par exemple, pour se remettre d'une infection) peut provoquer une poussée de MII.

### Quels sont les effets secondaires prévus ?

- Les effets secondaires courants sont les suivants : douleur, rougeur ou gonflement sur le site de l'injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, douleurs articulaires et fièvre. Vous pouvez également avoir des nausées, de la diarrhée ou un gonflement des ganglions des aisselles.

### Après avoir reçu le vaccin, devrais-je encore pratiquer la distanciation sociale et porter un masque ?

- Oui, toute personne vaccinée devra encore suivre les mesures de santé publique en place à ce moment-là, telles que la distanciation physique, le port du masque et l'hygiène des mains.



### Scannez le code QR pour obtenir des renseignements supplémentaires et une lettre

Créée par le groupe de travail de Crohn et Colite Canada que les personnes atteintes de MII peuvent fournir aux pharmacies et aux autres sites d'administration des vaccins contre la COVID-19. Vous pouvez faire signer cette lettre par votre principal fournisseur de soins ou votre spécialiste des MII.

Mars 2021

Ces recommandations concernent uniquement les vaccins à ARNm et à vecteur adénoviral non répliquatif actuellement disponibles, et ne s'appliquent pas nécessairement aux vaccins qui pourraient être approuvés à l'avenir. Les présentes recommandations sont susceptibles d'être modifiées à mesure que de nouvelles données et informations seront générées. Crohn et Colite Canada pourra réviser ces recommandations lorsque de nouvelles données scientifiques seront disponibles.